

Признаки интоксикации психоактивными веществами:

Изменения внешнего вида и поведения, напоминающие состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя или слабom, не соответствующем состоянию, запахе.

Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость или злобность, агрессивность, не соответствующие ситуации.

Изменение речи: ускорение, подчёркнутая выразительность, замедленность, невнятность, нечёткость (каша во рту).

Изменение цвета кожных покровов: бледность или покраснение лица и верхней части туловища, блеск глаз или их «мутность», сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на изменения освещённости.

Изменение слюноотделения: повышенное или, наоборот, сухость во рту, осиплость голоса.

Изменение двигательной активности: повышенная (оживлённая) жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или, наоборот, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации)

Изменение координации движений: нарушение плавности, скорости, соразмерности (размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно при закрытых глазах), нарушение почерка.

Признаки лишения психоактивных веществ (абстиненции)

✓ Страдальский внешний вид, заострившиеся черты лица, запавшие глаза, землистый цвет кожи, неестественная бледность.

✓ Изменение самочувствия: вялость, угрюмость, подавленность, недовольство окружающими, капризность, злобность, агрессивность, тоска, безучастие к окружающему.

✓ Повышенная потливость.

✓ Изменение двигательной активности: неусидчивость, возбуждение или, наоборот, неспособность даже к незначительным физическим нагрузкам.

✓ Нарушение работы желудочно-кишечного тракта: снижение сил, отсутствие аппетита, рвота, понос

✓ Отсутствие желания курить даже у курильщиков с большим стажем.

✓ Болевые симптомы: боли в различных частях тела, иногда непроизвольные подёргивания отдельных мышц, головные боли, боли в сердце, желудке.

Наряду с этими специфическими признаками употребления психоактивных веществ существуют и другие, более общие признаки, которые по сути своей являются лишь косвенными доказательствами склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. Эти признаки чаще всего появляются на сравнительно ранних стадиях экспериментирования с психоактивными веществами, их легче всего обнаружить внимательным родителям, которые следят за поведением, интересами, склонностями своих детей и могут вовремя заметить надвигающуюся опасность.

✓ **Нарастающая скрытность** (возможно, без ухудшения отношений с родителями). Часто она сопровождается учащением и увеличением времени «гуляний».

✓ Самоизоляция в семье. Появляется четко выраженное уклонение от домашнего общения, неожиданное пренебрежение домашними правилами.

✓ Частые просьбы отпустить на ночь из дома, либо отсутствие по ночам без объяснения причин.

✓ Резкое снижение успеваемости и интереса к учебе.

✓ Участвовавшие прогулы занятий.

✓ Потеря интереса к привычным увлечениям.

✓ Появление привычки к длительному прослушиванию музыки или внезапная потеря интереса к ней.

✓ Нарастающая хитрость, изворотливость и лживость.

✓ Потеря энтузиазма, безразличие к делам, безынициативность - «потухшие глаза».

✓ Частые и длительные уединения в туалете или ванной комнате.

✓ Появление высказываний о бессмысленности и тяжести жизни.

✓ Серьезное отношение к лозунгам, типа «живи быстро, умри молодым».

✓ Интерес к разговорам о наркотиках.

✓ Убежденное отстаивание «свободы личности употреблять наркотики», идей о «бесперспективности борьбы с ними».

✓ Пропажа из дома денег, ценностей, книг, одежды, радиоаппаратуры и т.д.

✓ Участвовавшее выпрашивание денег у родственников.

✓ Наличие значительных денежных сумм без объяснения причины их появления.

✓ Противоправные действия или кражи вне дома.